

氯雷他定片说明书



甲类

请仔细阅读说明书并按说明使用或在药师指导下购买和使用

【药品名称】

通用名称：氯雷他定片

商品名称：怡邦

英文名称：Loratadine Tablets

汉语拼音：Lileitading Pian

【成份】

本品每片含氯雷他定 10 毫克。辅料为：淀粉、糊精、蔗糖、50%乙醇、十二烷基硫酸钠、硬脂酸镁。

【性状】本品为白色或类白色片。

【作用类别】本品为耳鼻喉科及皮肤科用药类非处方药药品。

【适应症】用于缓解过敏性鼻炎有关的症状，如喷嚏、流涕、鼻痒、鼻塞以及眼部痒及烧灼感。口服药物后，鼻和眼部症状及体征得以迅速缓解。亦适用于缓解慢性荨麻疹、瘙痒性皮肤病及其他过敏性皮肤病的症状及体征。

【规格】10 毫克

【用法用量】口服。

成人及 12 岁以上儿童：一日 1 次，一次 1 片（10 毫克）。

2~12 岁儿童：

体重>30 公斤：一日 1 次，一次 1 片（10 毫克）。

体重≤30 公斤：一日 1 次，一次半片（5 毫克）。

【不良反应】在每天 10 毫克的推荐剂量下，本品未见明显的镇静作用。

常见不良反应有乏力、头痛、嗜睡、口干、胃肠道不适包括恶心、胃炎以及皮疹等。罕见不良反应有脱发、过敏反应、肝功能异常、心动过速及心悸等。

【禁忌】尚不明确。

【注意事项】1. 严重肝功能不全的患者请在医生指导下使用。

2. 妊娠期及哺乳期妇女慎用。

3. 在作皮试前的约 48 小时左右应中止使用本品，因抗组胺药能阻止或降低皮试的阳性反应发生。

4. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

5. 本品性状发生改变时禁止使用。

6. 请将本品放在儿童不能接触的地方。
7. 儿童必须在成人监护下使用。
8. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【药物相互作用】 1.同时服用酮康唑、大环内酯类抗生素、西咪替丁、茶碱等药物，会提高氯雷他定在血浆中的浓度，应慎用。其他已知能抑制肝脏代谢的药物，在未明确与氯雷他定相互作用前应谨慎合用。

2.如与其他药物同时使用可能会发生药物相互作用，详情请咨询医师或药师。

【药理作用】本品为高效、作用持久的三环类抗组胺药，为选择性外周 H₁ 受体拮抗剂。可缓解过敏反应引起的各种症状。

【贮藏】遮光、密封保存。

【包装】 铝塑包装，6片/板/盒，7片/板/盒，10片/板/盒，6片/板×2板/盒，7片/板×2板/盒。

【有效期】 24个月。

【执行标准】《中国药典》2010年版第二增补本。

【批准文号】国药准字 H20045777。

【说明书修订日期】2013年12月01日

【生产企业】

委托方企业名称：江苏亚邦爱普森药业有限公司 受托方企业名称：江苏亚邦强生药业有限公司

委托方注册地址：江苏省盐城市响水县城经济开发区 受托方生产地址：江苏省金坛市华城路198号

委托方邮政编码：224600 受托方邮政编码：213200

委托方电话号码：0515-6869900 受托方电话号码：0519-2313008

委托方传真号码：0515-6869908 受托方传真号码：0519-2324949

如有问题可与生产企业联系