

核准日期：2007 年 05 月 15 日

修改日期：2010 年 05 月 28 日

盐酸氨溴索葡萄糖注射液说明书

请仔细阅读说明书并在医师指导下使用。

【药品名称】

通用名称：盐酸氨溴索葡萄糖注射液

商品名称：耐邦

英文名称：Ambroxol Hydrochloride and Glucose Injection


汉语拼音：Yansuan Anxiusuo Putaotang Zhushuye

【成份】本品为复方制剂，其组份为每 100ml 中含盐酸氨溴索 15mg 与葡萄糖 5g。

盐酸氨溴索：

化学名称：反式-4-[(2-氨基-3,5-二溴苄基)氨基]环己醇盐酸盐

化学结构式：



分子式：C₁₃H₁₈Br₂N₂O · HCl

分子量：414.56

【性状】本品为无色澄明液体。

【适应证】

1、适用于术后肺部并发症的预防性治疗，早产儿及新生儿呼吸窘迫综合症的治疗。

2、适用于伴有痰液分泌不正常及排痰功能不良的急、慢性呼吸道疾病，如慢性支气管炎急性加重、喘息型支气管炎、支气管扩张及支气管哮喘的祛痰疗法。

【规格】100ml：盐酸氨溴索 15mg 与葡萄糖 5g

【用法用量】

成人及 12 岁以上儿童每次 15mg，每日 2~3 次静脉滴注，重症可增至每次 30mg；

6~12 岁儿童每次 15mg，每日 2~3 次；

2~6 岁儿童每次 7.5mg，每日 3 次；

2 岁以下儿童每次 7.5mg，每日 2 次。

婴儿呼吸窘迫综合症 30mg/kg/日，分 4 次给药，静脉输注时间至少 5 分钟。

【不良反应】本药的耐受性较好，偶见轻微的胃肠道反应，过敏反应极少见。

【禁忌】对本品任一成份过敏者禁用。

【注意事项】临床前试验及用药 28 周后的大量临床经验显示，对妊娠没有不良影响。但妊娠期间，尤其是妊娠前三个月应慎用药物。药物可进入乳汁，但治疗剂量对婴儿无影响。避免同时服用强力镇咳药。

【孕妇及哺乳期妇女用药】妊娠初期的头三个月内慎用。

【儿童用药】参见用法用量。

【老年用药】参见用法用量。

【药物相互作用】与抗生素如阿莫西林、头孢呋新、红霉素、强力霉素同时使用，可导致抗生素在肺组织浓度升高。故本品同上述任何药物联合用于治疗肺部感染时，均可提高其抗菌

疗效。

【药物过量】迄今无有关过量症状的报道。如发生，应对症处理。

【药物毒理】本品为溴己新在体内的代谢，具有黏痰溶解作用。可使痰中的多黏纤维断裂从而稀释痰液，并通过抑制糖蛋白的合成而降低痰黏度，使痰便于排出。

【药代动力学】本品易吸收。较多分布于肺、肝、肾,血浆蛋白结合率为 90%。主要通过肝脏代谢，半衰期为 7~12 小时，从尿中排泄。

【贮藏】遮光，密闭保存。

【包装】玻璃输液瓶 100ml/瓶/盒。

【有效期】暂定 24 个月。

【执行标准】国家食品药品监督管理局标准（试行）YBH08872004

【批准文号】国药准字 H20040886

【生产企业】企业名称：江苏亚邦生缘药业有限公司

生产地址：江苏省滨海县城沿河西路 62 号

邮政编码：224500

电话号码：0515-84191801 84191906

传真号码：0515-84108632

产品服务热线：0519-86388066

0519-86388099

网址：www.yabang.biz