

核准日期：2006 年 12 月 21 日
修改日期：2007 年 10 月 11 日
修改日期：2010 年 10 月 01 日
修改日期：2011 年 05 月 31 日

硫酸沙丁胺醇片说明书

请仔细阅读说明书并在医师指导下使用
严禁用于食品和饲料加工

【药品名称】


通用名称：硫酸沙丁胺醇片

英文名称：Salbutamol Sulfate Tablets

汉语拼音：Liusuan Shading' anchun Pian

【成份】 本品主要成份为硫酸沙丁胺醇，其化学名称为 1-(4-羟基-3-羟甲基苯基)-2-(叔丁氨基)乙醇硫酸盐。

化学结构式：



分子式： $(C_{13}H_{21}NO_3)_2 \cdot H_2SO_4$

分子量：576.71

【性状】 本品为白色片。

【适应症】 用于缓解支气管哮喘或喘息型支气管炎伴有支气管痉挛的病症。

【规格】 按 $C_{13}H_{21}NO_3$ 计算 2mg)

【用法用量】 口服 成人每次 1-2 片，一日 3 次。

【不良反应】 常见肌肉震颤，亦可见恶心、心率加快或心律失常。偶见有头晕、头昏、头痛、目眩、口舌发干、心烦、高血压、失眠、呕吐、颜面潮红等。

【禁忌】 对本品其它肾上腺素受体激动剂过敏者禁用。

【注意事项】

1. 本品仅有支气管扩张作用，作用持续时间约 4 小时，不能过量使用。
2. 高血压，冠状动脉供血不足，心血管功能不全，糖尿病、甲状腺机能亢进等患者慎用。
3. 久用本品易产生耐受性，使药效降低。此时患者对肾上腺素等扩张支气管作用的药物也同样产生耐受性，使支气管痉挛，不易缓解，哮喘加重。

【孕妇及哺乳期妇女用药】 孕妇禁用，哺乳期妇女慎用。

【儿童用药】 未进行该项实验且无可靠参考文献。

【老年用药】 未进行该项实验且无可靠参考文献。

【药物相互作用】

1. 本品与其他 β 受体激动剂合用，药效可增加，但也导致不良反应增加。
2. 本品与 β_2 受体阻滞剂合用，则药效减弱或消失。
3. 本品不宜与抗抑郁药同用。
4. 本品与茶碱类药物并用时，可增加松弛支气管平滑肌的作用，但也可能增加不良反应。

【药物过量】 未进行该项实验且无可靠参考文献。

【药理毒理】 主要作用于支气管肾上腺素受体，松弛平滑肌。

【药代动力学】 未进行该项实验且无可靠参考文献。

【贮藏】 遮光，密封保存。

【包装】 塑料瓶，100片/瓶。

【有效期】 24个月。

【执行标准】《中国药典》2010年版二部

【批准文号】 国药准字 H32024535

【生产企业】 企业名称：江苏亚邦爱普森药业有限公司

生产地址：江苏省盐城市响水县城经济开发区

邮政编码：224600

电话号码：0515-86869900

传真号码：0515-86869908