

核准日期：2006 年 12 月 21 日

修改日期：2010 年 10 月 01 日

氧氟沙星滴眼液说明书

请仔细阅读说明书并在医师指导下使用

【药品名称】通用名称：氧氟沙星滴眼液


英文名称：Ofloxacin Eye Drops

汉语拼音：Yangfushaxing Diyanye

【成份】本品主要成份为：氧氟沙星。

化学名称：(±)-9-氟-2,3-二氢-3-甲基-10-(4-甲基-1-哌嗪基)-7-氧代-7H-吡啶并[1,2,3-de]-[1,4]苯并噁嗪-6-羧酸。

结构式：



分子式： $C_{18}H_{20}FN_3O_4$

分子量：361.38

【性状】本品为淡黄色或淡黄绿色的澄明液体。

【适应症】本品适用于治疗细菌性结膜炎、角膜炎、角膜溃疡、泪囊炎、术后感染等外眼感染。

【规格】5ml：15mg

【用法用量】滴于眼内，每日 3~5 次，每次 1~2 滴，或遵医嘱。

【不良反应】偶尔有辛辣似蜇样的刺激症状。

【禁忌】对氧氟沙星或喹诺酮类药物过敏者禁用。

【注意事项】

- 1、不宜长期使用；
- 2、使用中出現过敏症状，应立即停止使用。
- 3、只限于滴眼用。
- 4、滴眼时瓶口勿接触眼睛；使用后应将瓶盖拧紧，以免污染药品。
- 5、当药品性状发生改变时，禁止使用。
- 6、儿童必须在成人监护下使用。
- 7、请将此药品放在儿童不能接触的地方。

【孕妇及哺乳期妇女用药】尚不明确。

【儿童用药】尚不明确。

【老年用药】尚不明确。

【药物相互作用】

氧氟沙星与抗凝剂之间的相互作用不明显，本品与头孢噻肟、甲硝唑、克林霉素、环孢菌素等同用后，各药物的药动学过程均无明显改变。

【药物过量】尚不明确。

【药理毒理】

通过抑制细菌的 DNA 旋转酶和 DNA 复制而发挥作用。由于其独特的作用机理，具有抗菌谱广、抗菌活性强的特点，对革兰氏阴性菌、阳性菌群均有较强的抗菌作用。对葡萄球

菌、化脓性链球菌、溶血性链球菌、肠球菌、肺炎球菌、大肠杆菌、柠檬酸细菌属、肺炎杆菌、肠菌属、沙雷氏菌属、变形杆菌属、铜绿假单胞菌、流感嗜血杆菌、不动杆菌属、弯曲杆菌属、衣原体属敏感性菌种等感染有效。本品与其他类抗菌药未见交叉耐药性。

【药代动力学】

一滴点眼后，1小时角膜浓度达最大值 3.22 μ g/ml,房水浓度 30分钟达峰值 0.71 μ g/ml。局部点眼后的眼内通透性良好。

【贮藏】遮光、密封保存。

【包装】塑料瓶，5ml/支 \times 1支/盒。

【有效期】24个月。

【执行标准】《中国药典》2010年版二部

【批准文号】国药准字 H32023170

【生产企业】企业名称：江苏亚邦爱普森药业有限公司

生产地址：盐城市响水县城经济开发区

邮政编码：224600

电话号码：0515—86869900

传真号码：0515—86869908