

# 阿昔洛韦乳膏说明书



甲类

外

请仔细阅读说明书并按说明使用或在药师指导下购买和使用

## 【药品名称】

通用名称：阿昔洛韦乳膏

英文名称：Aciclovir Cream

汉语拼音：Axiluowei Rugao

## 【成份】

本品每支含阿昔洛韦 0.3 克。辅料为：十二醇硫酸钠、防腐剂（羟苯乙酯）、甘油、十八醇、白凡士林、液体石蜡。

【性状】本品为白色乳膏。

【作用类别】本品为皮肤科用药类非处方药药品。

【适应症】用于单纯疱疹或带状疱疹感染。

【规格】3%。

## 【用法用量】

局部外用。取适量本品涂患处，成人与小儿均为白天每 2 小时 1 次，一日 4~6 次，共 7 日。

【不良反应】可见轻度疼痛、灼痛、刺痛、瘙痒以及皮疹等。

【禁忌】尚不明确。

## 【注意事项】

1. 连续使用 7 日，症状未缓解，请咨询医师。
2. 本品仅用于皮肤黏膜，不能用于眼部。
3. 涂药时应戴指套或手套。
4. 用药部位如有烧灼感、瘙痒、红肿等情况应停药，并将局部药物洗净，必要时向医师咨询。
5. 孕妇、哺乳期妇女慎用。
6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。
7. 本品性状发生改变时禁止使用。
8. 请将本品放在儿童不能接触的地方。
9. 儿童必须在成人监护下使用。
10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

## 【药物相互作用】

如与其他药物同时使用可能会发生药物相互作用，详情请咨询医师或药师。

## 【药理作用】

本品为嘌呤核苷类抗病毒药。其作用机制是干扰病毒 DNA 多聚酶而抑制病毒的复制，对单纯疱疹病毒、水痘带状疱疹病毒、巨细胞病毒等具有抑制作用。

【贮藏】密封，在凉暗干燥处（避光并不超过 20℃）保存。

【包装】聚乙烯/铝/聚乙烯复合管包装，10 克/支/盒。

【有效期】24 个月。

【执行标准】《中国药典》2010 年版二部。

【批准文号】国药准字 H32025837。

【说明书修订日期】2010 年 10 月 01 日

【生产企业】企业名称：江苏亚邦强生药业有限公司

生产地址：江苏省金坛市华城路 198 号

邮政编码：213200

电话号码：0519-82313008

传真号码：0519-82324949

如有问题可与生产企业联系